


Только про мальчиков: что важно знать мамам?

Гигиена половых органов

- Подмывать малыша надо спереди назад
- Можно промывать половой орган струей воды из душа, стараясь мягко направить ее под крайнюю плоть без сильного напора
- Используется обычная проточная вода
- После гигиенических процедур не должно быть покраснения, трещин, кровотечения или других повреждений крайней плоти
- Можно применять детские средства для интимной гигиены
- Гигиена должна быть безболезненной и простой для ребенка
- Гигиенические процедуры проводятся 1 раз в день и после дефекации



Заболевания половых органов

- **Физиологическое сужение крайней плоти** — вариант нормы, не требует лечения либо может быть показано мягкое растяжение. При этом состоянии:
 - наружное отверстие крайней плоти должно быть достаточно широким для нормального мочеиспускания
 - оно должно позволять проводить гигиену
 - к подростковому возрасту (примерно к 13–14 годам) крайняя плоть должна полностью отодвигаться, а головка полового члена — оголяться
- **Рубцовый фимоз** — рубцовые изменения ткани крайней плоти, требуется хирургическое лечение.
- **Гипертрофический фимоз** — удлинение крайней плоти (напоминает «хоботок»), также требуется операция.
- **Баланит** — воспаление головки полового члена.
- **Баланопостит** — воспаление головки и крайней плоти. У маленьких детей эти состояния часто проявляются вместе.
- **Крипторхизм** — неопущение яичка, требуется операция.
- **Перекрут яичка** — самое опасное состояние, так как может привести к гибели яичка, требует СРОЧНОЙ ОПЕРАЦИИ.
- **Перекрут гидатиды** (рудиментарного придатка) также нуждается в оперативном лечении.
- **Гидроцеле** — это водянка яичка, то есть скопление жидкости в полости мошонки. В ряде случаев проходит самостоятельно с возрастом.
- **Паховая грыжа** — выпячивание части внутренних органов через слабое место в мышцах живота в области паха, требуется операция.


Основные симптомы заболеваний половых органов

- Отек
- Гнойное отделяемое
- Беспокойство ребенка во время мочеиспускания
- Покраснение
- Увеличение мошонки в размерах
- Мочеиспускание в несколько приемов
- Боль
- Выпячивание в паховой области
- Затрудненное мочеиспускание

Как часто ходить ко врачу?

- В первый год жизни — два осмотра у хирурга-уролога-андролога
- До достижения пятилетнего возраста — один раз в год
- В старшем возрасте кратность осмотров может быть уменьшена по рекомендации врача

РОДЫ
в Москве



КАК БЕСПЛАТНО РОДИТЬ В МОСКВЕ, НЕ ПРОЖИВАЯ В СТОЛИЦЕ?

Узнайте о преимуществах столичных роддомов на сайте проекта «Роды в Москве»

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

roddom.msk.ru