

Прививаем малыша до 1 года

Когда делать?	От какого заболевания?	Что полезно знать?
В 1-й день жизни	Вирусный гепатит В	Если есть медицинские противопоказания (например, недоношенность), то можно сделать позже в поликлинике по месту жительства.
На 3-7 день	Туберкулез	Прививку еще называют БЦЖ.
В 1 месяц	Вирусный гепатит В	Повторная вакцинация (здесь и далее) делается для усиления эффекта.
В 2 месяца	Пневмококковая инфекция	Прививка защитит от пневмонии, отита, менингита.
В 3 месяца	Коклюш, столбняк, дифтерия, полиомиелит	Ребенок, не привитый от столбняка, может заразиться им и умереть, оцарапавшись на детской площадке!
В 4-5 месяцев	Коклюш, столбняк, дифтерия. 2-я прививка от полиомиелита. 2-я прививка от пневмококковой инфекции.	Между первой прививкой и повторной вакцинацией не должно пройти меньше 45 дней.
В полгода	3-я прививка от гепатита В. 3-я прививка от коклюша, столбняка, дифтерии. 3-я прививка от полиомиелита	В этом возрасте уже можно привить малыша и от гриппа, но прививка не входит в список обязательных.
В 7-11 месяцев	Ни от какого!	Прививочный перерыв. Кроме тех случаев, когда по каким-то причинам не были сделаны более ранние прививки.
В год	Эпидемический паротит, корь, краснуха	Эпидемический паротит еще называют «свинкой».